

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

IMP. LILLE. 62.01451

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU NORD-OUEST (Tél. Arras 23-14)

ABONNEMENT ANNUEL

(SEINE-MARITIME, SOMME, PAS-DE-CALAIS, NORD)

12 NF

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux.

C. C. P. : LILLE 57-01-67

n° XXIII

- 1er Aout 1962 -

## INFORMATIONS

### - M I L D I O U -

### POMMES DE TERRE

La situation est loin d'être inquiétante. Si l'on excepte quelques foyers très localisés dans la Somme, la région d'Hesdin et la région de Cambrai, la maladie est inexistante en plein champ. Il est toutefois possible qu'une apparition de taches se produise vers les 2 - 3 aout dans les régions ayant subi les orages du 25-26 juillet (au moins 15-20 mm). En conséquence,

1) Dans les régions touchées par les fortes pluies orageuses du 25-26 juillet (en particulier, la zone littorale du Pas de Calais et les Flandres et localement de ci de là) il est prudent d'assurer la protection des cultures qui doivent rester en végétation jusqu'à la fin-aout par un deuxième et dernier traitement effectué du 2 au 4 aout (cette année, employer de préférence un organique de synthèse).

2) Dans les autres régions et pour toutes les cultures qui doivent arriver à maturité avant la mi-aout, il semble inutile d'intervenir.

REMARQUE GÉNÉRALE : Dans le courant d'aout, surveiller cependant les cultures pour être prêt à défaner éventuellement en cas d'apparition tardive de la maladie.

### - NOCTUELLE GAMMA -

### BETTERAVES

Une invasion de Noctuelle Gamma vient de se produire et des dégâts importants ont été commis en particulier dans la région de Ham et localement en Seine-Maritime. Au bon moment, l'attention des planteurs a été justement attirée sur ces ravageurs par l'I.T.B., les meilleurs résultats étant obtenus avec l'emploi des produits à base d'Aldrine ou de Dieldrine à la dose de 1 Kgr  $\bar{5}$  de matière active à l'hectare. La nymphose des chenilles est avancée et il semble que les dégâts vont cesser d'ici 8 à 10 jours.

REMARQUE : Bien surveiller l'évolution des pucerons dans les champs traités contre la Noctuelle car l'équilibre biologique a pu être perturbé et une recrudescence des attaques de puceron est à envisager.

### - C A R P O C A P S E -

### CULTURES FRUITIÈRES

Le 1er vol est terminé. Le traitement conseillé du 20 au 22 a contrôlé les pénétrations les plus importantes. Cependant quelques pénétrations échelonnées se produiront encore dans la 1ère quinzaine d'Aout et le dernier traitement a été plus ou moins lessivé par les orages du 25-26 juillet. Dans les vergers très sensibles aux attaques de ce ravageur un nouveau traitement peut donc s'avérer utile dès réception de cet avis.

REMARQUE : Ce traitement est particulièrement valable pour la zone littorale du Pas de Calais.

TAVELURES - Pour éviter les contaminations tardives sur fruit effectuer un traitement soigné entre le 15 et le 20 Aout.

OIDIUM - La période des contaminations graves est terminée. On peut donc arrêter la lutte.

### TEIGNE DES CRUCIFÈRES

### CULTURES MARAÎCHÈRES

Ces petites chenilles vertes qui attaquent choux, navets etc... sont très nombreuses cette année. Employer si besoin est un produit à base de D.D.T. soit en poudrage, soit en pulvérisation avec l'adjonction d'un mouillant.

Le Contrôleur : R. DIVOUX

L'Inspecteur : P. COUTURIER